

	ANEXO			ANX
	GUIA DE TERAPIA ANTIMINICROBIANA EMPÍRICO UTI NEONATAL			ANX-SCIH-33
	Data de Emissão: 04/04/2023	Data da Revisão: 27/08/2025	Número da Revisão: 03	Página: 1 de 1
APLICAÇÃO:	SERVIÇOS PRÓPRIOS			

Foco	Infecção comunidade Sepse precoce < 5d	Infecção associada à saúde Sepse tardia > 5d
Respiratório	Ampicilina + Gentamicina ou Cefalotina + Gentamicina * Se mãe com ITU prévio	Cefepima + Vancomicina
Corrente sanguínea	(até 3 dias) < 3d Oxacilina + Amicacina	> 3 d Vancomicina + Amicacina
Urinário	Cefalotina + Gentamicina	Cefepima + Amicacina
Sem foco definido/ Íleo séptico	Oxacilina + Amicacina + Metronidazol	Cefepima + Metronidazol + Vancomicina
Enterocolite	Vancomicina + Metronidazol + Amicacina	Cefepima + Metronidazol + Vancomicina * Se uso prévio de Cefepima: Meropenem
Infecção fúngica	Fluconazol	Fluconazol * Se suspeito endocardite: Micafungina

Sugestões empíricas foram embasadas nos resultados das culturas ano 2024