

Caxias do Sul, 07 de janeiro de 2024.

Comunicado

Prezados Cirurgiões

O uso da mupirocina intranasal mostrou-se uma estratégia para prevenção do sítio cirúrgico através da descolonização do estafilococos nasal.

Estratégia com alto grau de evidência para cirurgias **ortopédicas e cardiotorácicas**.

Porém ela deve ser administrada 5 dias antes do procedimento cirúrgico (PRÉ-OPERATÓRIA).

Reforçamos essa orientação para que os pacientes já venham de casa com o tratamento **realizado** com a mupirocina.

Sugerimos a prescrição de mupirocina 2x/dia por 5 dias **ANTES** para os pacientes que serão submetidos a cirurgias ortopédicas e cardiotorácicas.

No hospital, em pacientes internados, otimizaremos o uso da mupirocina naqueles que realizarão cirurgias ortopédicas e cardiotorácicas e que não utilizaram o tratamento em casa.

Não coletaremos mais swab nasal, nessas circunstâncias.


Decolonize surgical patients with an antistaphylococcal agent in the preoperative setting for orthopedic and cardiothoracic procedures. (Quality of evidence: HIGH).

Decolonize surgical patients for other procedures at high risk of staphylococcal SSI, such as those involving prosthetic material. (Quality of evidence: LOW)

Notably, universal decolonization for targeted procedures is likely more cost effective than screen-and-treat strategies.

Universal decolonization may also be easier to implement.

HHS Public Access Author manuscript Infect Control Hosp Epidemiol. Author manuscript; available in PMC 2024 May 04. Published in final edited form as: Infect Control Hosp Epidemiol. 2023 May; 44(5): 695–720. doi:10.1017/ice.2023.67.



Giorgia Torresini – CRM 23269

Médica Infectologista Coordenadora do SCIH/Hospital Círculo Saúde.