

	DIRETRIZ			DIR
	ESCROTO AGUDO			DIR-UUE-15
	Data de Emissão: 08/07/2024	Data da Revisão: 08/07/2024	Número da Revisão: 00	Página: 1 de 2
APLICAÇÃO:	SERVIÇOS PRÓPRIOS			


1. OBJETIVO

Padronização do processo de identificação e tratamento para paciente com diagnóstico escroto agudo.

2. DEFINIÇÕES

Este documento foi elaborado para educação e pretende servir como um auxílio ao cuidado dos pacientes, baseado na literatura medica atual. Não deve substituir o julgamento clínico ou ditar cuidados para pacientes individuais

3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO



3.1 Tratamento:

- Orquitepididimite:

Indivíduos <35 anos (presumivelmente via sexual):

- Ceftriaxone: 500 mg IM dose única;
- Doxiciclina 100 mg VO de 12/12 horas por 14 dias.

	DIRETRIZ			DIR
	ESCROTO AGUDO			DIR-UUE-15
	Data de Emissão: 08/07/2024	Data da Revisão: 08/07/2024	Número da Revisão: 00	Página: 2 de 2
APLICAÇÃO:	SERVIÇOS PRÓPRIOS			

Indivíduos >35 anos (suspeita de adquirida por bacteriúria):

- Ciprofloxacino 500 mg 12/12 horas por 10 dias.

Em casos de *C. Trachomatis* a parceira sexual deve ser tratada.

Associar AINE ao tratamento.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Urologia Brasil / (editores) Aguinaldo Cesar Nardi. (et al.) São Paulo: PlanMark; Rio de Janeiro: SBU-Sociedade Brasileira de Urologia, 2013.

DIRETRIZES PARA INFECÇÕES UROLÓGICAS. M. Grabe (presidente), T.E. Bjerklund-Johansen, H. Botto,

M. Cek, K.G. Naber, R.S. Pickard, P. Tenke, F. Wagenlehner, B. Wullt.

5. REGISTROS

Não se aplica.