

	ANEXO			ANX
	GUIA DE TERAPIA ANTIMICROBIANA EMPIRÍCA UTI ADULTO			ANX-SCIH-29
	Data de Emissão: 20/08/2021	Data da Revisão: 02/02/2024	Número da Revisão: 03	Página: 1 de 1
APLICAÇÃO:	SERVIÇOS PRÓPRIOS			

Foco	Infecção da comunidade (<5 dias)	Infecção associada à assistência à saúde (>5 dias)
Pulmonar	Levofloxacino	Cefepima + Vancomicina ± Amicacina * Função renal limítrofe: Linezolida * Uso prévio de Cefepima: Ertapenem
Corrente sanguínea associado a um cateter	Oxacilina + Amicacina	Vancomicina + Amicacina * Função renal limítrofe: Daptomicina
Infecção abdominal Infecção ferida operatória	Ampicilina/sulbactam ou Ciprofloxacino + Metronidazol	Cefepima / Amicacina / Metronidazol ± Vancomicina (se associado a prótese)
Urinário	Ampicilina/sulbactam ± Amicacina	Amicacina + Cefepima
Sem foco definido	Ceftriaxona + Gentamicina	Cefepima + Amicacina + Vancomicina * Se uso prévio de Cefepima: Usar Imipenem
Neutropenia febril	Cefepima ± Vancomicina se instabilidade hemodinâmica	Cefepima ± Vancomicina * Uso prévio de Cefepima: Imipenem * Função renal limítrofe: Daptomicina
* Neutropenia prolongada e evidência de infecção fungica: Voriconazol * KPC: Polimixina B + Amicacina + Imipenem		

Exemplar para uso exclusivo de: Thais Giotti - Círculo Saúde