

	ANEXO			ANX
	GUIA DE TERAPIA ANTIMICROBIANA EMPÍRICO PEDIATRIA			ANX-SCIH-30
	Data de Emissão: 05/04/2023	Data da Revisão: 05/04/2023	Número da Revisão: 00	Página: 1 de 1
APLICAÇÃO:	SERVIÇOS PRÓPRIOS			

Foco	Infecção comunitária	Infecção associada à assistência à saúde
Pulmonar	Lactente: Oxacilina + Ceftriaxona Crianças e adolescentes: Ampicilina/sulbactam	Cefepima + Vancomicina * Uso prévio de Cefepima (nos últimos 7 dias): Usar Imipenem
Urinário	Cefalotina ± Gentamicina ou Ampicilina/sulbactam	Amicacina
Abdominal	Ampicilina/sulbactam ou Cefuroxima + Metronidazol	Cefepima + Metronidazol
Pele e Partes Moles	Oxacilina + Gentamicina ou Amoxicilina+clavulanato	Vancomicina + Ceftazidima
Meningite	Ceftriaxona + Aciclovir	Ceftriaxona ± Vancomicina * Se dispositivo invasivo
Sem foco definido	Ceftriaxona + Gentamicina	Vancomicina + Amicacina + Cefepima * Se uso prévio de Cefepima: Usar Imipenem
Corrente sanguínea associada a cateter	-	Vancomicina + Amicacina
Neutropenia Febril	Cefepima ± *Vancomicina * Se instabilidade hemodinâmica	Cefepima +* Vancomicina * Se uso prévio de Cefepima: Usar Imipenem