

	ANEXO			ANX
	GUIA DE TERAPIA ANTIMICROBIANA EMPÍRICO ADULTO			ANX-SCIH-31
	Data de Emissão: 04/04/2023	Data da Revisão: 04/04/2023	Número da Revisão: 00	Página: 1 de 1
APLICAÇÃO:	SERVIÇOS PRÓPRIOS			

Foco	Infecção comunitária	Infecção associada à assistência à saúde
Pulmonar	Ampicilina/sulbactam ou Levofloxacino	Cefepima + Vancomicina * Se uso prévio de Cefepima: Usar Imipenem
Urinário	Cefalotina + Gentamicina ou Ampicilina/sulbactam	Amicacina * Se ITU recorrente: Ertapenem + Amicacina
Abdominal	Ampicilina/sulbactam ou Ciprofloxacino + Metronidazol	Cefepima + Metronidazol
Infecção pele e partes moles	Oxacilina + Gentamicina ou Amoxicilina+clavulanato	Vancomicina + Ceftazidima
Meningite	Ceftriaxona + Aciclovir	Ceftazidima ±* Vancomicina * Se dispositivo ou pós-operatório
Sem foco definido	Ceftriaxona + Gentamicina	Cefepima + Amicacina + Vancomicina * Se uso prévio de Cefepima: Usar Imipenem
Corrente sanguínea associado a cateter	–	Vancomicina + Amicacina
Neutropenia febril	Cefepima ± *Vancomicina * Se instabilidade hemodinâmica	Cefepima + Vancomicina * Se uso prévio de Cefepima: Usar Imipenem

* Neutropenia prolongada e evidência de infecção fungica: Voriconazol

* KPC: Polimixina B + Amicacina + Imipenem